

Präparatotyp

IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion ist ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit Kurzzeiteinwirkung, ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe.

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionsnähten peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionsnähten von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenerreicher Haut; Kühlumschläge.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen. IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionsnähten peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionsnähten von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenerreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchter Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffes) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion wirkt nicht sporenbabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen ungeeignet.

Mikrobiologie

IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion wirkt gegen:
bakterizid (inkl. Tbc) / fungizid (Candida albicans) / begrenzt viruzid

Anwendungskonzentrationen / Einwirkzeit

Hygienische Händedesinfektion:

Bakterizid und fungizid (Candida alb.)	30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion:	3 Min.
Bakterizid und fungizid (Candida alb.)	3 Min.
Gutachten für hygienische und chirurgische Händedesinfektion: HBV / HCV / HIV / H5N1 / H1N1 / Herpes / Coronavirus incl. SARS-CoV Rota-Viren Noroviren	15 Sek. 60 Sek. 5 Min.

Gegenanzeigen

IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben der Haut mit IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Produktzusammensetzung

Wirksamer Bestandteil: 62,8 g 2-Propanol
Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser zu 100 g

Chemisch-Physikalische Zusammensetzung

Aussehen des Konzentrats: pinke Flüssigkeit
Dichte (20°C): zwischen 0,875 und 0,878
Löslichkeit in Wasser: mischbar
Flammpunkt nach DIN 51 755: 22°C

IHDENT® Dentatrend® Händedesinfektion entspricht hinsichtlich der „sauer und alkalisch reagierenden Substanzen“ den Vorschriften des gültigen Arzneibuches.

Sicherheitshinweise

P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210

Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P243

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P280

Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P303 / P361 / P353

Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

P305 / P351 / P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P304 / P340

BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P312

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P403 / P235

Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Bei verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Kennzeichnung

UN-Nummer 1219

Lagerhinweise

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.
Dicht verschlossen aufbewahren.

Besonderer Hinweis

Vor Gebrauch immer die Gebrauchsanweisung und das Sicherheitsdatenblatt lesen.

Von Kindern fernhalten.

Packungsgrößen

1 L	REF D0070
5 L*	REF D0071

Gutachten: Liegen vor; bei Bedarf bitte anfordern.

9999-D0070-03

Letzte Überarbeitung 2015-03

IHDENT® und Dentatrend® sind eingetragene Warenzeichen.

* Nur durch Vertrieb erhältlich.

Dr. Ihde Dental AG

 Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Vertrieb

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
D-85386 Eching/München
Tel. +49 (0)89 319 761-0
Fax +49 (0)89 319 761-33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de
www.desinfektion.com

Gefahr



H225

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Zeichenerklärungen



Gebrauchsanweisung lesen



Verfallsdatum



Chargennummer

BAG: CHZN 2176

Type of preparation

IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection is an alcoholic hand and skin disinfectant with short-term effect, and without cumulative long-lasting active ingredients.

Areas of use

Hygienic and surgical hand disinfection, skin disinfection prior to simple injections and puncturing of peripheral vessels, skin disinfection prior to operations and puncturing of joints, disinfection of skin rich in sebaceous glands; cold compresses.

Dosage instructions and types of application

For applying to the skin and preparing compresses. IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection: for hygienic hand disinfection, rub hands in the solution and keep moist for 30 seconds. For surgical hand disinfection, rub hands and forearms in the solution and keep moist for five minutes. For disinfection prior to simple injections and the puncturing of peripheral vessels, rub skin carefully with the solution and keep moist for 15 seconds. For disinfection prior to operations or puncturing of joints, rub skin carefully with the solution and keep moist for one minute. For the disinfection of skin areas rich in sebaceous glands, rub skin carefully with the solution and keep moist for ten minutes. For cold compresses, use the solution diluted with water in equal parts.

Notes: The times given are minimum times. In the event of complications (e.g. moist skin, dirt on the skin, risk of intervention), increase the application times.

IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection does not kill spores and is therefore unsuitable for storing sterile instruments and needles.

Microbiology

IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection is:

Bactericidal (incl. TB) / Fungicidal (*Candida albicans*) / (to a limited extent) Viricidal

Application concentrations / application time

Hygienic hand disinfection:

Bactericide and fungicide (*Candida alb.*) **30 sec.**

Surgical hand disinfection:

Bactericide and fungicide (*Candida alb.*) **3 min.**

Report on hygienic and surgical hand disinfection:

HBV / HCV/ HIV / H5N1 / H1N1 / herpes / coronavirus, incl. SARS CoV

Rotaviruses

Noroviruses

15 sec.

60 sec.

5 min.

Contraindications

IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection is not suitable for disinfecting open wounds.

Interactions with other substances

None known.

Side effects

Rubbing the skin with IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection can cause redness and a slight burning sensation.

Product composition

Active ingredient: 62,8 g 2-Propanol

Other ingredient: purified water up to 100 g

Chemical and physical composition

Appearance of concentrate: pink solution

Density (20°C): between 0,875 and 0,878

Solubility in water: mixable

Flash point to DIN 51 755: 22°C

IHDENT® Dentatrend® Hand disinfection complies with the regulations of the applicable pharmacopoeia with regard to 'acidic and alkaline-reacting substances'.

Precautionary statements

P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Read label before use.

P210

Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces – no smoking.

P243

Take precautionary measures against static discharge.

P280

Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.

P303 / P361 / P353

IF ON SKIN (or hair): remove / take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower.

P305 / P351 / P338

IF IN EYES: rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.

P304 / P340

IF INHALED: remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

P312

Call a POISON CENTRE or doctor / physician if you feel unwell.

P403 / P235

Store in a well-ventilated place. Keep cool.

Warnings

Highly flammable. Keep away from ignition sources. If you spill the solution, take immediate precautions against fire and explosion. Suitable precautions include mopping up the spilt fluid and diluting it with water, ventilating the room and removing anything that might set it alight.

Labelling

UN no. 1219

Storage conditions

Do not use after expiry date. Keep in a tightly closed container.

Special note

Always read the Instructions for Use and the Material Safety Data Sheet before use.

Keep out of reach of children.

Delivery units

1 L **REF D0070**

5 L* **REF D0071**

Expert opinions: Available on request.

9999-D0070-03

Revision date 2015-03

IHDENT® and Dentatrend® are registered trademarks.

* Only available via distributors.



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11

CH-8737 Gommiswald/SG

Tel. +41 (0)55 293 23 23

Fax +41 (0)55 293 23 00

contact@implant.com

www.implant.com

Distribution by

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19

D-85386 Eching/München

Tel. +49 (0)89 319 761-0

Fax +49 (0)89 319 761-33

info@ihde-dental.de

www.ihde-dental.de

www.desinfektion.com

Danger



H225

Highly flammable liquid and vapour.



H319

Causes serious eye irritation.



H336

May cause drowsiness or dizziness.

Legend



Read instructions



Expiration date



LOT Charge number

BAG: CH ZN 2176

Type de préparation

Le IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains est un désinfectant pour la peau et les mains à base d'alcool, à durée d'action très courte, et sans agents cumulés actifs à long terme.

Domaines d'utilisation

Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, désinfection de la peau avant les injections simples et ponctions des vaisseaux périphériques, désinfection de la peau avant opérations et ponctions des articulations, désinfection de la peau riche en glandes sébacées; compresses froides.

Posologie et mode d'application

Pour une application sur la peau et pour la préparation de compresses. IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains: pour une désinfection hygiénique des mains, frotter les mains avec la solution et les maintenir humides pendant 30 secondes. Pour une désinfection chirurgicale des mains, frotter les mains et les avant-bras avec la solution et les maintenir humides pendant 5 minutes. Pour la désinfection avant des injections simples et des ponctions de vaisseaux périphériques, frotter soigneusement la peau avec la solution et la maintenir humide pendant 15 secondes. Pour la désinfection avant les opérations et les ponctions des articulations, la peau est soigneusement frottée avec la solution et maintenue humide pendant 1 minute. Pour la désinfection de la peau riche en glandes sébacées, frotter soigneusement la peau avec la solution et la maintenir humide pendant 10 minutes. Pour les compresses froides, appliquer la solution en dilution avec de l'eau à parts égales.

Remarques: Les durées sont des durées minimales. Dans les cas plus complexes (p. ex. peau humide, salissure de la peau, risque de l'intervention), prolonger l'exposition. Le IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains n'a pas d'action sporicide et n'est donc pas adapté pour le stockage d'instruments et de seringues stériles.

Microbiologie

Le IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains agit comme: bactéricide (y compris Tbc) / fungicide (Candida albicans) / virucide limité

Concentrations d'utilisation / Durée d'action

Autorisation standard:	
désinfection hygiénique des mains	
bactéricide et fungicide (Candida alb.)	30 sec.
désinfection chirurgicale des mains	
bactéricide et fungicide (Candida alb.)	3 min.
Expertise pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains désinfection:	
VHB / VHC / VIH / H5N1 / H1N1 / Herpes /	15 sec.
Coronavirus y compris SARS-CoV	60 sec.
Rotavirus	5 min.
Norovirus	

Contre-indications

Le IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains n'est pas adapté à la désinfection de plaies ouvertes.

Interactions avec d'autres produits

Aucune interaction connue.

Effets secondaires

Lorsque l'on frotte la peau avec le IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains, des rougeurs et une légère sensation de brûlure peuvent apparaître.

Composition

Composant actif: 62,8 g 2-propanol
Autre composant: eau purifiée à 100 g

Composition physico-chimique

Aspect du concentré: liquide pink
Densité (20°C): entre 0,875 et 0,878
Solubilité dans l'eau: soluble
Point d'inflammation selon DIN 51 755:22°C

Le IHDENT® Dentatrend® Désinfection pour les mains satisfait aux dispositions de la pharmacopée en vigueur concernant les «substances acides et alcalines réactives».

Consignes de sécurité

- P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. – Ne pas

P243

fumer.

Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P280

Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

P303 / P361 / P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.

P305 / P351 / P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P304 / P340

EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P403 / P235

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Avertissements

Facilement inflammable! Tenir à l'écart de toute source d'inflammation! Si la solution est renversée, prendre immédiatement toutes les mesures de lutte contre le feu et les explosions. Les mesures appropriées comprennent par exemple la récupération du liquide renversé et la dilution avec de l'eau, la ventilation de la pièce et l'élimination des sources d'inflammation.

Marquage

Numéro ONU 1219

Conseil pour le stockage

Ne plus utiliser après la date de péremption.
Conserver hermétiquement fermé.

Remarque particulière

Avant utilisation, toujours lire la notice d'emploi et la fiche de sécurité.

Conserver hors de la portée des enfants.

Taille des conditionnements

1 L **REF D0070**

5 L* **REF D0071**

Expertises: disponibles; à demander si besoin.

9999-OW0075-03

Dernière date de modification 2015-03

IHDENT® e Dentatrend® sont des marques déposées.

* Uniquement disponible dans la distribution.



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11

CH-8737 Gommiswald/SG

Tel. +41 (0)55 293 23 23

Fax +41 (0)55 293 23 00

contact@implant.com

www.implant.com

Distribution

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19

D-85386 Eching/München

Tel. +49 (0)89 319 761-0

Fax +49 (0)89 319 761-33

info@ihde-dental.de

www.ihde-dental.de

www.desinfektion.com

Danger



H225

Liquide et vapeurs très inflammables.



H319

Provoque une sévère irritation des yeux.



H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Explication des symboles



Lire la notice avant toute utilisation



Date de péremption



Numéro de lot

BAG: CH ZN 2176

Tipo di preparato

Il IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani è un disinfettante a base di alcol per mani e pelle ad azione rapida, senza accumulo dei principi attivi.

Campi di applicazione

Disinfettante per le mani igienico e chirurgico. Disinfettante per la cute, da applicare prima di semplici iniezioni e paracentesi nei vasi periferici, disinfezione della pelle prima delle operazioni o delle paracentesi alle articolazioni, disinfezione della pelle ricca di ghiandole sebacee; impacchi freddi

Istruzioni di dosaggio e tipo di applicazione

Da applicare sulla pelle e per preparare impacchi. IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani: Per una disinfezione igienica delle mani, applicare la soluzione sulle mani e lasciarle inumidite per 30 secondi. Per una disinfezione chirurgica delle mani, applicare la soluzione sulle mani e sugli avambracci e lasciarle inumidite per 5 minuti. Per la disinfezione prima di iniezioni semplici e per paracentesi dei vasi periferici, applicare la soluzione accuratamente sullay pelle e mantenerla umida per 15 secondi. Per la disinfezione prima di operazioni e paracentesi delle articolazioni, applicare la soluzione accuratamente sulla pelle e mantenerla umida per 1 minuto. Per la disinfezione della pelle ricca di ghiandole sebacee, applicare la soluzione accuratamente sulla cute e mantenerla umida per 10 minuti. Per gli impacchi freddi la soluzione va utilizzata diluita con la stessa quantità di acqua.

Note: Le indicazioni temporali sono i valori minimi da rispettare. I tempi di azione vanno prolungati in presenza di ulteriori complicazioni (per es. pelle umida, pelle sporca, rischio di interventi). Il IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani non agisce uccidendo le spore e quindi non è adatto per la conservazione di strumenti e siringhe sterili.

Microbiologia

IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani ha un effetto: battericida (incl. tbc) / fungicida (*Candida albicans*) / limitatamente virucida

Concentrazioni / Tempo d'azione

Autorizzazione standard:

Disinfezione igienica delle mani

Battericida e fungicida (*Candida alb.*)

30 sec.

Disinfezione chirurgica delle mani

Battericida e fungicida (*Candida alb.*)

3 min.

Perizie per la pulizia igienica e chirurgica delle mani disinfezione:

HBV / HCV / HIV / H5N1 / H1N1 / Herpes /

Coronavirus incl. SARS-CoV

Rotavirus

Norovirus

15 sec.

60 sec.

5 min.

Controindicazioni

Il IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani non è adatto per disinfectare ferite aperte.

Interazioni con altri prodotti

Nessuna conosciuta.

Effetti collaterali

Se si massaggia la pelle con il IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani si possono verificare arrossamenti e un leggero bruciore.

Composizione

Componente attivo: 62,8 g 2-propanolo

Altro componente: Acqua purificata a 100 g

Composizione chimico-fisica

Aspetto del concentrato: liquido pink

Densità (20°C): tra 0,875 e 0,878

Solubilità in acqua: mischiabile

Punto di fiamma secondo la DIN 51 755: 22°C

Il IHDENT® Dentatrend® Disinfettante per le mani soddisfa le disposizioni della farmacopea in vigore in quanto è classificato tra le "sostanze acide e a reazione alcalina".

Avvertenze di sicurezza

P101

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere l'etichetta prima dell'uso.

Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. – Non fumare.

P102

P103

P210

P243

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

P280

Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.

P303 / P361 / P353

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

P305 / P351 / P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P304 / P340

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P312

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P403 / P235

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

Indicazioni di sicurezza

Facilmente infiammabile! Tenere lontano da fiamme e scintille! Se la soluzione viene rovesciata, è necessario adottare immediatamente misure antincendio e contro le esplosioni. Tra le misure raccomandate figurano per esempio la raccolta del liquido versato e la sua diluizione con acqua, l'aerazione del locale nonché l'eliminazione delle scintille e delle fiamme.

Denominazione

Numero UN 1219

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura ambiente. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Nota speciale

Prima dell'uso, si raccomanda di leggere le istruzioni d'uso e la scheda di sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Misure d'imballaggio

1 L REF D0070

5 L* REF D0071

Opinioni dell'esperto: disponibili su richiesta.

9999-OW0075-03

Ultima revisione 2015-03

IHDENT® e Dentatrend® sono marchi registrati.

* Disponibile solo tramite la distribuzione.

Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11

CH-8737 Gommiswald/SG

Tel. +41 (0)55 293 23 23

Fax +41 (0)55 293 23 00

contact@implant.com

www.implant.com

Ufficio vendite

Dr. Ihde Dental GmbH

Erfurter Str. 19

D-85386 Eching/München

Tel. +49 (0)89 319 761-0

Fax +49 (0)89 319 761-33

info@ihde-dental.de

www.ihde-dental.de

www.desinfektion.com

Pericolo



H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.



H319

Provoca grave irritazione oculare.



H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

Spiegazioni dei simboli



Leggere le istruzioni d'uso



Data di scadenza



Numero carica

BAG: CH ZN 2176

Общая характеристика

IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук - это средство для дезинфекции кожи рук и других участков тела на основе спирта с коротким сроком воздействия, без накопления долгосрочных активных веществ.

Область применения

Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук, дезинфекция кожи перед инъекциями и простыми проколами периферических сосудов, дезинфекция кожи перед операциями и при проколах суставов, дезинфекция кожи с большим количеством сальных желез; прохладные компрессы.

Дозировка и способ применения

Для нанесения на кожу и приготовления компрессов.

IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук: Для гигиенической дезинфекции рук нанесите и распределите средство на кожу рук и предплечий, держите влажными в течение 30 секунд. Для хирургической дезинфекции рук нанесите и распределите средство на кожу рук и предплечий, держите влажными в течение 5 минут. Для дезинфекции перед простыми инъекциями и проколами периферических сосудов разотрите по коже раствор и держите влажной поверхность в течение 15 секунд. Для дезинфекции перед операциями и проколами суставов тщательно разотрите по коже и держите влажной в течение 1 минуты. Для дезинфекции кожи с большим количеством сальных желез тщательно разотрите по коже и держать влажной в течение 10 минут. Для холодных компрессов разбавить раствор водой в одинаковом соотношении.

Замечания: приведенные численные данные – это минимальное время. В зависимости от дополнительных условий (например, влажная кожа, загрязнения кожи, риск процедур) время воздействия должно быть расширено. IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук не работает против спор и, следовательно, оно не подходит для хранения стерильных инструментов и игл.

Микробиология

IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук: бактерицидное (включая Tbc) / фунгицидное (Candida Albicans) / вирицидное (в ограниченном)

Концентрация при применении / время нанесения

Стандартизованный порядок:

бактерицидная и фунгицидная (Candida alb.)	30 сек.
Хирургическая дезинфекция рук:	
бактерицидная и фунгицидная (Candida alb.)	3 минуты
Отчет о гигиенической / хирургической дезинфекции рук:	
HBV / HCV / HIV / H5N1 / H1N1 / Герпес /	
Коронавирус включ. SARS-CoV	15 сек.
Ротавирусы	60 сек.
Норовирусы	5 минуты

Противопоказания

Не использовать IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук для дезинфекции открытых ран.

Взаимодействие с другими препаратами

Не известно.

Побочные эффекты

Если протереть кожу IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук средством может возникнуть покраснение и легкое жжение.

Состав

Активные вещества: 62,8 г 2-Пропанол

Другие вещества: очищенная вода до 100 г

Химико-физические данные

Внешний вид концентрата: розовый раствор

Плотность (20° С): между 0,875 и 0,878

Растворимость в воде: смешивается

Температура вспышки в соответствии с DIN 51 755: 22° C

IHDENT® Dentatrend® Дезинфектант для рук выполняет требования прикладной фармакопеи в отношении к "кислотным и щелочным реагирующими веществам".

Меры предосторожности

- P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или этикетку.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P103 Читайте этикетку перед использованием.
P210 Держать вдали от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. - Не курить.
P243 Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты для глаз / средства защиты для лица.

P303 / P361 / P353

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Удалить / Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / под душем.

P305 / P351 / P338

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они присутствуют и это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P304 / P340

ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P312

Обратиться в токсикологический центр или к специалисту врачу, если вы почувствовали недомогание.

P403 / P235

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.

Предупреждение

Легковоспламеняющееся! Хранить вдали от источников возгорания! Если вы пролили раствор необходимо немедленно принять меры против возгорания или взрыва. Соответствующие меры включают, например, сбор разлитого раствора и разбавление водой, проветривание помещения и устранение источников возгорания.

Маркировка

UN - Номер 1219

условия хранения

Не использовать после истечения срока годности. Емкость держать плотно закрытой.

Особое примечание

Всегда внимательно читать этикетку и паспорт по технике безопасности перед использованием.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка и форма поставки

1 L REF D0070

5 L* REF D0071

Мнения экспертов:

Доступен по требованию.

9999-D0070-03

Пересмотр проведен 2015-03

IHDENT® и Dentatrend® являются зарегистрированными торговыми знаками.

* Доступно только через дистрибуторов.



Dr. Ihde Dental AG

Dorfplatz 11

CH-8737 Gommiswald/SG

Tel. +41 (0)55 293 23 23

Fax +41 (0)55 293 23 00

contact@implant.com

www.implant.com

Дистрибутор

ООО ВанвейБиомед

BY 220123, Беларусь

г. Минск

Ул. Кропоткина 84

+375 29 997 99 99

info@swissbiomed.ru

Опасность



H225

Легко воспламеняющаяся жидкость и испарения.



H319

Вызывает серьезное раздражение глаз.



H336

Может вызывать сонливость и головокружение.

Условные обозначения



Необходимо читать инструкцию



Срок годности



Номер серии

BAG: CH ZN 2176